

## ～中年期以降の物忘れに～

和漢薬

せい かい さん  
晴快散

第3類医薬品

(顆粒)

和漢薬晴快散(顆粒)は、遠志(ヒメハギ科イトヒメハギ)のエキス顆粒剤です。  
遠志は、古来「遠くにまで(これから先も長く)志を持つことができる」といわれているように、それを服用すれば気持ち(精神)を保ち物忘れをしないといわれています。  
遠志は、中国医学の基礎となった書物である神農本草経にも収載され、その薬能は「咳逆、傷中を主どる。また、不足を補い、邪気を除き、九竅を利し、智慧を益し、耳目を聡明にし、物を忘れず、志を強くし、力を倍す。」とあります。漢方処方製剤では帰脾湯、人参養栄湯、加味温胆湯などに精神神経用薬、保健強壮用薬の目的として配合されています。  
和漢薬晴快散(顆粒)は“中年期以降の物忘れの改善”にお勧めです。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

次の人は服用しないでください。

- (1) 次の診断を受けた人。  
認知症
- (2) 認知症の疑いのある人。



## ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 服用後、次の症状が現れた場合
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合又は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
下痢
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、 食欲不振、胃部不快感
精神神経系	めまい

## その他の注意

本剤の服用により、糖尿病の検査値(血中1.5-AG)に影響を及ぼす場合があります。

## 効能・効果

中年期以降の物忘れの改善

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に温湯又は水にて服用してください。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人 (15歳以上)	1 包 (1.2g)	3 回
15歳未満	服用しないこと	

## 成分・分量

3包(成人の1日服用量)中

成 分	分 量
オンジエキス (オンジ3gに相当)	1.3g

添加物としてデキストリン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖水和物を含有します。

### 〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

### お問い合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室

0120 -432 -894

[月～金曜日/10:00～17:00 (祝日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県 前橋市富士見町赤城山1193